
Asociación Española de Pediatría | CAV Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones

RECOMENDACIONES PARA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL INFANTIL 2026-2027



1 RELEVANCIA CLÍNICA Y CARGA DE EDAD

La gripe afecta anualmente al 30-40% de los niños, causando enfermedades graves y muy graves. Incluso en pacientes sanos.

2 RECOMENDACIONES DE EDAD: DESDE 6 MESES A 17 AÑOS

Vacunación sistemática desde 6 meses hasta los 17 años.





3 ALTA EFECTIVIDAD EN PEDIATRÍA

La efectividad en niños (51-82%) es constantemente superior a la observada en adultos.

4 PREFERENCIA POR LA VACUNA INTRANASAL

Recomendada a partir de los 2 años por su mayor aceptación.





5 PRIORIZACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO

Captación activa de pacientes con patologías crónicas, convivientes y cuidadores.

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPTACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2026-2027



1 VACUNACIÓN ESCOLAR DE ALTO IMPACTO

Las campañas de vacunación frente a la gripe llevadas a cabo en los centros escolares han sido bien acogidas y han demostrado gran efectividad.

2 ACCESIBILIDAD Y HORARIOS AMPLIADOS

Aumentar los horarios de vacunación en los centros de salud, facilitando la visita de las familias, ha demostrado ser una medida eficaz.





3 SINERGIA CON ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

El trabajo en equipo es una forma efectiva de ofrecer una información solida y facilita la práctica en la consulta.

4 EL PODER DE LA RECOMENDACIÓN ACTIVA

Aprovechar cada visita de la familia a la consulta para fomentar e informar sobre la vacunación frente a la gripe es una oportunidad que no ha de perderse.





5 COMUNICACIÓN SOBRE EL RIESGO REAL

La gripe no es un catarro más fuerte. Es necesario ofrecer información real sobre el riesgo real que supone la gripe, también en pacientes sanos.